


Hogyan kezelhető a mellkasi fájdalom?



Az esetek többségében azonban a mellkasi fájdalom nem sürgősségi ellátást igénylő szív-, illetve tüdőbetegség miatt jelentkezik. Ha orvosa úgy látja, hogy Ön nincs közvetlen veszélyben, előfordulhat, hogy átvizsgálása és kezelése járóbetegként fog történni.

A szív rossz saját keringésének javítására alkalmazott három leggyakoribb eljárás a gyógyszeres kezelés, az angioplasztika és a koronária bypass műtét. Ha az angina pektórisz hátterében szív eredetű húzódik meg, az alábbi gyógyszerek állnak rendelkezésre:

- Aszpirin (acetilszalicilsav). Az aszpirin gátolja a vérlemezkék kicsapódását, vagyis a váralvadás (egyik) első lépését, ezzel segít megelőzni a véráram hirtelen megakadását a plakkos falú erekben (aterotrombózis ellenes hatás). Zajló szívinfarktus közben bevéve az aszpirin csökkenti a halálozási arányt. Ebben az esetben érdemes elrágni az aszpirint, hogy gyorsabb legyen a felszívódás (máskülönben nem javasolt, mert árt a fogaknak). Az aszpirint a legtöbb szívinfarktuson átesett embernek javasolják a későbbiekben is.

[Tovább>>>](#)